



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección Regional
de Salud Tumbes



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO REGIONAL 2026



CONTENIDO

Dengue
Malaria
Zika
Chikungunya
Leptospirosis
EDAS
IRAS
Neumonías
Muerte Materna y Perinatal
Infecciones Intrahospitalarias
Otros daños sujetos a vigilancia
epidemiológica



Semana
Epidemiológica
N° 04



DIRECCION EJECUTIVA
EPIDEMIOLOGIA

(Del 25 al 31 de enero del 2026)

DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA

PRESENTACIÓN

La Dirección Ejecutiva de Epidemiología hace llegar el presente boletín correspondiente a la Semana Epidemiológica 04-2026.

La información del presente Boletín Epidemiológico procede de la notificación de 47 establecimientos de salud de la Red Regional de Epidemiología.

La Red Regional está conformada por establecimientos de la Dirección Regional de Salud Tumbes, EsSalud y otros del sector salud de la región Tumbes.

La información es actualizada cada semana o mes. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación.

Esta información es suministrada semanalmente por la Red Regional de Epidemiología de Tumbes, cuya fuente es el registro semanal de enfermedades y eventos sujetos a notificación inmediata o semanal. La Semana Epidemiológica inicia el domingo de cada semana y concluye el día sábado siguiente.

VERSIÓN ELECTRÓNICA

El boletín es un producto de la Dirección Ejecutiva de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud Tumbes. Se autoriza el uso total o parcial siempre y cuando se expresen las fuentes de información de este producto.



www.epi.diresatumbes.gob.pe



epitumbes@dge.gob.pe

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE SALUD TUMBES

Lic. Obst. Nancy Melina Jimenez Arismendiz

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

- ❖ Mg. Percy Mc Quen Vilchez Barreto
Director Ejecutivo
- ❖ Dr. Wilmer Jhon Davis Carrillo
Director de Inteligencia Sanitaria en Salud Pública
- ❖ Mg. Rommell Veintimilla Gonzalez Seminario
Director de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública
- ❖ Dra. María Edith Solis Castro
Director de Brotes y EVISAP
- ❖ Mg. Luis Constantino Arévalo Guerrero
Equipo Técnico
- ❖ Bach. Ronald Edward Hernández Vargas
Equipo Técnico
- ❖ Lic. Estefani Yudith Espinoza Risco
Equipo Técnico
- ❖ Lic. Judith Sofia Zarate Mogollon
Equipo Técnico
- ❖ Obst. Vicente Andres Cordova Zarate
Equipo Técnico
- ❖ Lic. Esmeralda Berline Herrera Silva
Equipo Técnico
- ❖ Lic. Carlos Jhonatan Palacios Olaya
Equipo Técnico
- ❖ Ing. Jhon Cristhian Carbajal Crisanto
Equipo Técnico
- ❖ Téc. Contab. César Augusto Palacios Chalen
Digitador
- ❖ Lic. Adm. Tatiana Liseth Vasquez Jimenez
Asistente Administrativo

REDACCION Y EDICIÓN

- ❖ Obst. Vicente Andres Cordova Zarate
- ❖ Bach. Ronald Edward Hernández Vargas

PROCESO DE INFORMACIÓN

- ❖ Bach. Ronald Edward Hernández Vargas

DISEÑO

- ❖ Bach. Ronald Edward Hernández Vargas
- ❖ Ing. Jhon Cristhian Carbajal Crisanto

Alerta Epidemiológica de Sarampión

La Dirección Regional de Salud de Tumbes, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Epidemiología ha emitido la Alerta Epidemiológica Regional N° 001-2026, por el **“Riesgo de Introducción y transmisión del virus de sarampión en la Región de Tumbes ante caso importado en el Perú”**; con el objetivo de alertar a los establecimientos de salud públicos y privados a nivel regional por el riesgo de introducción y transmisión del virus de sarampión ante caso confirmado importado, con la finalidad de intensificar las actividades de vacunación, de la vigilancia epidemiológica de sarampión-rubéola (SR), identificación temprana y tratamiento de casos eruptivo febriles.

<https://www.diresatumbes.gob.pe/index.php/direcciones/epidemiologia/alertas-epidemiologicas>



EL SARAMPIÓN PUEDE AFECTAR A PERSONAS DE CUALQUIER EDAD NO VACUNADAS

Sintomas

- Fiebre** 
- Erupción cutánea** 
- Chorreo de nariz** 
- Conjuntivitis u ojos rojos** 
- Tos** 

Cualquier caso con fiebre y erupción cutánea (rash) puede ser una sospecha de sarampión



Dengue - Región Tumbes SE 04-2026

En lo que va del año 2026 la región de Tumbes ha notificado 140 casos de dengue, de los cuales el 7,14% son confirmados y el 92,86% se encuentran en calidad de probables; según cuadro clínico el 94,28% corresponde a dengue sin signos de alarma y el 5,72% corresponden a casos de dengue con signos de alarma (Tabla1).

Tabla 1. Distribución según forma clínica y SE de inicio de enfermedad reportados hasta SE04-2026

Dengue	Confirmado	Probable	casos
sin signos de alarma	8	124	132
con signos de alarma	2	6	8
grave	0	0	0
Defunción	0	0	0
Departamento de Tumbes	10	130	140

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Tabla 2. Número de casos, incidencia y defunciones de dengue, Región Tumbes, periodo 2022*-2026*

	2022*	2023*	AÑOS 2024*	2025*	2026*
N° de Casos*	56	31	307	83	140
Diferencia respecto al año anterior (%)	0	-44,6	890,3	-73	68,7
Incidencia por 100mil hab.	21,58	11,78	115,48	30,85	41,75
Defunciones	0	9	1	1	0

(*) Hasta la SE 04/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

En comparación a lo reportado en la misma SE 04 del año 2025 con 83 casos, se evidencia en el presente 2026 un aumento del 68,70% respecto al año anterior. La TIA en el 2025 a la SE 04 se encontraba en 30,85 casos por 100 mil habitantes. En el presente año no se han notificado defunciones por dengue (Tabla 2).

Hasta la SE 04 del año 2026 se registran 140 casos de dengue, que corresponde a una tasa de incidencia acumulada (TIA) de 41,75 x 100 mil hab. (Tabla 3). El 84,62% (11/13) de los distritos reportan casos de dengue, siendo los distritos de Tumbes (55,71%), Corrales (10,71%) y Zorritos (7,14%) los que presentan el mayor número de casos (Tabla 3).


Tabla 3. Tasa de incidencia acumulada distrital de dengue a la SE 04, Región Tumbes, periodo 2025-2026*

Distritos	2025			2026		
	casos	%	TIA 100 mil Hab.	casos	%	TIA 100 mil Hab.
San Juan De La Virgen	4	4,82	62,55	7	5,00	101,54
Tumbes	49	59,04	53,79	78	55,71	63,19
San Jacinto	2	2,41	19,89	6	4,29	55,08
Pampas De Hospital	8	9,64	92,19	5	3,57	53,32
Corrales	13	15,66	54,13	15	10,71	46,78
Zorritos	1	1,20	5,01	10	7,14	46,02
La Cruz	1	1,20	8,03	6	4,29	44,46
Papayal	2	2,41	17,09	3	2,14	23,61
Matapalo	0	0,00	0,00	1	0,71	12,34
Zarumilla	2	2,41	5,91	5	3,57	11,45
Aguas Verdes	1	1,20	3,72	4	2,86	11,43
Canoas De Punta Sal	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Casitas	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Departamento Tumbes	83	100,00	30,85	140	100,00	41,75

(*) Hasta la SE 04/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Gráfico 1. Comportamiento de dengue, Región Tumbes, 2026 (SE 01-04)
canal endémico



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

En la presente SE del 2026 la Región Tumbes se encuentra en zona de **EPIDEMIA** para dengue, lo que indica una alta transmisión de la enfermedad, en las últimas semanas del presente año muestra un aumento de casos (Gráfico 1).



Tabla 4. Tasa de incidencia acumulada
según Curso de Vida, Tumbes 2026 (SE 01-04)

curso de vida	Frecuencia	%	T.I.Ax100 mil hab.
Niño [0-11]	42	30,00%	70,80
Adolescente [12-17]	11	7,86%	32,45
Joven [18-29]	23	16,43%	36,87
Adulto [30-59]	53	37,86%	39,21
Adulto Mayor [60+]	11	7,86%	24,68
Total	140	100,00%	52,04

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB)
– CDC/MINSA

Con relación al sexo las mujeres resultan ser más afectadas (50,71%) (Gráfico 2).


Gráfico 3. Mapa de Riesgo de la 51-53/2025-01-03/2026 (Seis últimas semanas)



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB)
– CDC/MINSA

Según curso de vida los casos se distribuyen en todas las edades, con mayor frecuencia en adultos y niños. Las TIA más altas corresponden a los niños y adultos (70,80 x 100 mil hab. y 39,21 x 100 mil hab. respectivamente) (Tabla 4).


Gráfico 2. Distribución de casos según Sexo, Tumbes 2026 (SE01-04)



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/ MINSA

En las últimas seis semanas los distritos de Corrales, Tumbes, San Juan de la Virgen y Pampas de Hospital muestran alto riesgo de transmisión, seguido de los distritos de Zorritos, La Cruz y San Jacinto con mediano riesgo de transmisión de dengue (Gráfico 3).

Gráfico 4. Comportamiento de dengue y casos de febriles por semanas epidemiológicas, Tumbes, 2021-2026*




(*) Hasta la SE 04/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

El gráfico 4, muestra la evolución temporal de los casos febriles (línea) y casos confirmados de dengue (barras) por semanas epidemiológicas en la región Tumbes, durante el período 2021–2026 (hasta la SE 04/2026). Se observa un patrón endemo-epidémico claramente estacional, con incrementos recurrentes de cuadros febriles que preceden o acompañan los picos de dengue. Al inicio de 2026, ambas series muestran una tendencia descendente, aunque con persistencia de casos.

Dengue vs variables climáticas SE 01-04/2026**Gráfico 5. Temperatura media y Casos de Dengue (2024-2025*)**

TUMBES -
Temperatura media
Dengue 2024-2025



(*) Hasta la SE 04/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Tmedia (clima): Media histórica (2001-2020) de la temperatura media semanal


Tmedia actual: Temperatura media semanal

Se observa que la temperatura y la lluvia presenta una relación directa con los casos de dengue para la Región Tumbes. Desde la SE 16-2024 la temperatura media ambiental ha disminuido trayendo consigo una disminución de los casos de dengue.

Según proyección de la temperatura media para lo que queda del 2024 e inicio del 2025 se espera un incremento de está proyectándose también probablemente un mayor número de casos de dengue (Grafico 5).

Gráfico 6. Precipitación y Casos de Dengue (2024-2025*)

TUMBES -
Precipitación
Dengue2024-2025



(*) Hasta la SE 04/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Tmedia (clima): Media histórica (2001-2020) de la temperatura media semanal


Tmedia actual: Temperatura media semanal

Situación similar se observa con las precipitaciones pluviales y su relación con los casos de dengue. Al inicio de año ante el incremento de lluvias doce semanas después los casos ascendieron (Grafico 6).

Dengue vs variables climáticas SE 01-04/2026**Enero 2026 - Marzo 2026**

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, pone a disposición el pronóstico trimestral de lluvias y temperaturas extremas para los tomadores de decisiones de los sectores sensibles al clima como la agricultura, la salud, los recursos hídricos y la gestión de riesgos de desastres. Los pronósticos trimestrales están enmarcados en la escala estacional y obedecen a las condiciones esperadas de la temperatura superficial del mar, así como los factores atmosféricos asociados a la variabilidad del clima que posteriormente son analizados bajo un enfoque de Consenso.

Gráfico 7. Pronóstico climático de precipitaciones y casos de dengue, Región de Tumbes, SE 01-04/2026




Fuente: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-climatico>

NORMAL

Cuando las probabilidades de ocurrencia de temperatura entre el escenario "normal" y "superior" a lo normal son próximas y son las más altas.

Gráfico 9. Pronóstico climático de temperatura mínima y casos de dengue, Región de Tumbes, SE 01-04/2026




Fuente: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-climatico>

NORMAL

Escenario más probable de precipitaciones dentro de condiciones normales.

Gráfico 8. Pronóstico climático de temperatura máxima y casos de dengue, Región de Tumbes, SE 01-04/2026



Fuente: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-climatico>

NORMAL

Escenario más probable de temperatura dentro de condiciones normales.



Chikungunya - Región Tumbes SE 04/2026

Tabla 5. Casos de Fiebre por virus Chikungunya por procedencia, Región Tumbes (SE 01–53/2025)

Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIAx100mil hab.
	N.º	TIAx100mil hab.	N.º	TIAx100mil hab.		
TUMBES	0	0,00	16	17,56	16	17,56
LA CRUZ	0	0,00	1	8,03	1	8,03
ZORRITOS	0	0,00	1	5,01	1	5,01
Total	0	0,00	18	6,69	18	6,69

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Tabla 6. Casos de fiebre por virus Chikungunya por procedencia, Región Tumbes, 2024*–2025*

Distritos	2024*		2025*		Casos en la SE 46 2025
	casos	%	casos	%	
TUMBES	15	46.88	16	88.89	0
ZORRITOS	0	0.00	1	5.56	0
LA CRUZ	1	3.13	1	5.56	0
AGUAS VERDES	2	6.25	0	0.00	0
ZARUMILLA	9	28.13	0	0.00	0
CORRALES	1	3.13	0	0.00	0
PAPAYAL	4	12.50	0	0.00	0
Dpto Tumbes	32	100.00	18	100.00	0

(*) Hasta la SE 53/2025

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Según curso de vida los casos notificados hasta la SE 53-2025 corresponden según frecuencia a niños (72,22%) (Tabla 7).

A la SE 04-2026 no se han registrado casos de Chikungunya.

En el 2025 a la SE 53 se reportaron 18 casos probables; distribuidos en los distritos de Tumbes (88,90%), La Cruz (5,55%) y Zorritos (5,55%) (Tabla 5).

En el 2024 se reportaron 32 casos de Chikungunya, de los cuales 05 casos son confirmados (15,63%) y 27 casos están como probables (84,37%) (Tabla 6).

Tabla 7. Casos de fiebre por virus Chikungunya por curso de vida, Región Tumbes, 2025 (SE 01–53)

curso de vida	Frecuencia	%
Niño [0-11]	13	72,22%
Adolescente [12-17]	1	5,56%
Joven [18-29]	2	11,11%
Adulto [30-59]	1	5,56%
Adulto Mayor [60+]	1	5,56%
Total	18	100,00%

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Tabla 8. Casos y tasas de incidencia acumulada de fiebre por virus Chikungunya, Perú, 2023-2025*

Departamentos	2023			2024			2025*			Casos en la SE 52 2025
	casos	%	TIA 100 000 Hab.	casos	%	TIA 100 000 Hab.	casos	%	TIA 100 000 Hab.	
TUMBES	18	22,78	6,84	32	84,21	12,04	18	75,00	6,69	0
LORETO	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2	8,33	0,19	0
LIMA	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	4,17	0,01	0
PIURA	47	59,49	2,21	6	15,79	0,28	1	4,17	0,05	0
LAMBAYEQUE	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	4,17	0,07	0
AYACUCHO	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	4,17	0,15	0
PASCO	1	1,27	0,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
SAN MARTIN	13	16,46	1,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Perú	79	100,00	0,23	38	100,00	0,11	24	100,00	0,07	0

(*) Hasta la SE 53/2025

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

A nivel nacional, hasta la SE 53 del 2025 se han notificado 24 casos de Chikungunya. En el 2024 desde la SE 01 hasta la SE 52, se notificaron 38 casos de Chikungunya en el país, Tumbes aporta con el 84,21% de los casos de todo el país (Tabla 8).



Leptospirosis - Región Tumbes SE 04-2026

A la SE 04-2026 se han registrado 03 casos probables de leptospirosis. En el 2025 a la SE 53 se reportaron casos 322 casos de Leptospirosis, de los cuales 282 casos (87,58%) son probables y 40 casos (12,42%) son confirmados.

La TIA regional en el 2025 es de 121,12 casos x 100 mil hab. 04 distritos presentan una TIA por encima del valor regional: San Juan de la Virgen, Corrales, Tumbes y San Jacinto (Tabla 9).

Hasta la SE 52-2024 se notificaron 346 casos de leptospirosis, de los cuales se confirmaron 181 casos (52,31%). Lo que revela una situación de subdiagnóstico en la región por las directrices actuales para considerar un caso como confirmado (MAT 1:800).

Tabla 9. Tasa de incidencia y casos de Leptospirosis según distrito de infección, Región Tumbes, 2026

Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIAx100mil hab.
	N.º	TIAx100mil hab.	N.º	TIAx100mil hab.		
Aguas Verdes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Canoas De Punta Sal	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Casitas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Corrales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
La Cruz	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Matapalo	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pampas De Hospital	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Papayal	0	0,00	0	0,00	0	0,00
San Jacinto	0	0,00	0	0,00	0	0,00
San Juan De La Virgen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tumbes	0	0,00	2	1,62	2	1,62
Zarumilla	0	0,00	1	2,29	1	2,29
Zorritos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Región Tumbes	0	0,00	3	0,01	3	0,89

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Gráfico 10. Mapa de Riesgo según 06 últimas semanas epidemiológicas, Región Tumbes, (51-53/2025-01-03/2026)



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

El comportamiento de la notificación de casos de leptospirosis en las últimas 6 semanas del 2026 ubicó a los distritos de Tumbes y Zarumilla con alto riesgo de transmisión (Gráfico 10).

Tabla 10. Casos acumulados de leptospirosis por grupos de curso de vida, Región Tumbes, 2026

curso de vida	Frecuencia	%	T.I.Ax100mil hab.
Niño [0-11]	2	66,67%	3,37
Adolescente [12-17]	0	0,00%	0,00
Joven [18-29]	1	33,33%	1,60
Adulto [30-59]	0	0,00%	0,00
Adulto Mayor [60+]	0	0,00%	0,00
Total	3	100,00%	

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

En el 2026, según curso de vida, los grupos más afectados son los niños y jóvenes (TIA: 3,37 x 100 mil hab. y 1,60 x 100 mil hab. respectivamente) (Tabla 10).

**Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), Neumonías y SOB
- Región Tumbes SE 04-2026**


Hasta la SE 04 del presente año se han notificado a nivel regional 665 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en menores de 5 años; además se han notificado 8 casos de neumonías y 58 casos de SOB (Tabla 11).

Tabla 11. Casos de IRAs en < 05 años según tipo de diagnóstico, Región Tumbes (SE 01-04/2026)

DIAGNOSTICO	N° CASOS/SEMANA				TOTAL
	1	2	3	4	
IRA	192	153	156	164	665
NEUMONIA	4	2	1	1	8
NEUMONIA_GRAVE	0	0	0	0	0
SOB	17	16	15	10	58
TOTAL	213	171	172	175	731


Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB)
– CDC/MINSA

Gráfico 11. Incidencia acumulada distrital de IRAs en < de 5 años, Región Tumbes, 2026 (SE01-04)



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB)
– CDC/MINSA

Gráfico 12. Mapa de riesgo de IRAs en < de 5 años según 03 últimas semanas epidemiológicas 02-04/2026




Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

La tasa de incidencia acumulada regional de IRAs en <05 años es de 346,12 x 10 mil hab., 08 distritos presentan las incidencias por encima del valor regional: Casitas, Zorritos, Papayal, Pampas de Hospital San Juan de la Virgen, Aguas Verdes, San Jacinto y Corrales.

Según priorización de riesgo los distritos de Casitas, San Jacinto, San Juan de la Virgen, zorritos y Papayal presentan alto riesgo (Grafico 11). En relación a las últimas 03 semanas el distrito de San Jacinto presenta alto riesgo de transmisión de IRAs (Grafico 12).

Gráfico 13. Comportamiento de IRAs, Región Tumbes, 2026 (SE 01-04)
canal endémico



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

El canal endémico de IRAs muestra que hasta la SE 04-2026 se encuentran en zona de **ÉXITO** (Grafico 13).

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA



Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) - Región Tumbes SE 04- 2026

Tabla 13. Comportamiento de EDAs según semanas epidemiológicas, Región Tumbes, (SE 01-04/2026)

EDAS POR GRUPO ETAREO	N°CASOS/SEMANA				TOTAL
	1	2	3	4	
Menor de 1 año	2	12	11	9	34
De 1 a 4 años	33	50	47	45	175
Mayores de 5 años	93	91	107	112	403
TOTAL	128	153	165	166	612

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA


Hasta la SE 04-2026 se han notificado 209 casos de EDAs en menores de 05 años y 403 casos en mayores de 05 años, los que sumados hacen un total de 612 casos de EDAS en población general en la región Tumbes (Tabla 13).

Tabla 14. Tasa de incidencia x 10 mil hab. de las EDAs en < de 05 años, Región Tumbes, 2026 (SE01-04)

DISTRITO	CASOS	POBLACION	T.I x 10mil hab.
La Cruz	4	704	56,82
San Juan De La Virgen	2	341	58,65
Zarumilla	15	1958	76,61
Canoas De Punta Sal	6	654	91,74
Tumbes	80	8530	93,79
Corrales	18	1907	94,39
Zorritos	13	1023	127,08
Matapalo	6	447	134,23
Aguas Verdes	24	1707	140,60
Casitas	2	129	155,04
Papayal	11	621	177,13
San Jacinto	13	612	212,42
Pampas De Hospital	15	580	258,62
Departamento Tumbes	209	19213	108,78

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Gráfico 17. Mapa de riesgo de EDAs en < de 05 años, según 03 últimas semanas epidemiológicas, Región Tumbes, (02-04/2026)



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA


La tasa de incidencia regional en < de 05 años es de 108,78 casos x 10 mil < de 05 años (Tabla 14); mientras que en las últimas 3 semanas epidemiológicas los distritos de Casitas, Pampas de Hospital, Papayal y Aguas Verdes presentan alto riesgo de transmisión de EDAs (Gráfico 17).

Tabla 15. Tasa de incidencia x 10 mil hab. de las EDAs en población general, Región Tumbes, 2026 (SE01-04)

DISTRITO	CASOS	POBLACION	T.I x 10mil hab.
Pampas de Hospital	47	9.377	50,12
San Jacinto	42	10.894	38,55
Matapalo	21	8.101	25,92
Zorritos	52	21.729	23,93
Canoas Punta Sal	26	10.984	23,67
Papayal	28	12.708	22,03
Aguas Verdes	68	34.996	19,43
Casitas	13	6.991	18,60
Corrales	56	32.068	17,46
La Cruz	21	13.495	15,56
Tumbes	189	123.440	15,31
Zarumilla	47	43.687	10,76
San Juan de la Virgen	2	6.894	2,90
Departamento Tumbes	612	335364	18,25

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Gráfico 18. Mapa de riesgo de EDAs en población general según 03 últimas semanas epidemiológicas, Región Tumbes, (02-04/2026)




Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

La tasa de incidencia regional en población general es de 18,25 casos x 10 mil hab. (Tabla 15); mientras que en las últimas 3 semanas epidemiológicas los distritos de San Jacinto y Pampas de Hospital presentan alto riesgo de transmisión de EDAs (Gráfico 18).

Según el canal endémico de EDAS en la presente semana nos encontramos en zona de **EPIDEMIA** (Gráfico 19).

Gráfico 19. Comportamiento de las EDAs en población general, Región Tumbes, 2026 (SE01-04) Canal Endémico



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Otros Daños de Notificación - Región Tumbes SE 04-2026


Hasta la SE 04-2026 no se han registrado muertes maternas.

En el año 2025 se reportó 01 muerte materna directa, precedente del distrito de Corrales.

En los últimos 10 años la razón de muerte materna (RMM) ha oscilado entre 22,4 x 100 mil nv a 137,6 x 100 mil nv (Gráfico 20).

MORTALIDAD FETAL Y NEONATAL

Gráfico 21. Comportamiento de las Muertes fetales y neonatales años 2010–2026*



(*) Hasta la SE 04/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Hasta la presente SE 04-2026 se han notificado 05 muertes fetales y neonatales, de las cuales de las cuales 03 corresponde a muertes fetales y 02 muerte neonatal. En el 2025 se notificaron 34 casos de muertes fetales y neonatales, de las cuales 19 corresponde a muertes fetales y 15 muerte neonatal. En el 2024 se notificaron 38 muertes perinatales, de las que 20 corresponden a muertes fetales y 18 a muertes neonatales (Gráfico 21).

En relación a las muertes neonatales el 50,00% se dieron en el tercer trimestre de la gestación (01 casos), con pesos que oscilaban desde los 1500-2499gr. (bajo peso al nacer) (Tabla 16).


VIRUS VIRUELA DEL MONO (MPOX)

A la SE 04/2026 No se han reportado casos.

En el año 2024 se notificaron 6 casos sospechosos de MPOX en Tumbes, los cuales fueron descartados mediante PCR.

En el año 2022 se confirmó 01 caso (varón de 29 años de edad).

Gráfico 21. Comportamiento del MPOX, Región Tumbes, periodo 2020–2026*




(*) Hasta la SE 04/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

MORTALIDAD MATERNA

Gráfico 20. Comportamiento de las muertes maternas y razón de mortalidad materna, Región Tumbes, 2013-2023



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Tabla 16. muertes neonatales, según edad gestacional y peso al nacimiento, Región Tumbes, 2026 (SE01-04)


Edad Gestacional (Semanas)	Peso al nacimiento (gr)					Total
	Extremadamente bajo peso al nacer (500-900gr)	Muy bajo peso al nacer (1000-1499 gr)	Bajo peso al nacer (1500-2499 gr)	Peso adecuado (2500 - 3999 gr)	Macrosómico (4000 gr. a más)	
31		1				1
37			1			1
Total	0	1	1	0	0	2

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

MALARIA

Hasta la SE 04-2026 no se reportan casos. En el 2025 se notificaron 04 casos de malaria vivax de las cuales 02 corresponden a casos importados y 02 caso autóctonos.

Gráfico 22. Comportamiento de la Malaria, Región Tumbes, periodo 2000–2026*



(*) Hasta la SE 04/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA



Accidentes por Animales Ponzosñosos - Región Tumbes SE 04-2026

OFIDISMO


Tabla 17. Casos de ofidismo según distrito,
Región Tumbes, 2024-2026* (SE01-04)

Distrito	Casos 2024	Casos 2025	Casos 2026*
Matapalo	5	8	0
Aguas Verdes	2	2	0
Zarumilla	0	3	0
San Jacinto	0	2	0
San Juan De La Virgen	0	0	1
Canoas De Punta Sal	1	0	0
Tumbes	0	1	0
Total	8	16	1

(*) Hasta la SE 04/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Gráfico 23. Comportamiento de ofidismo, Región Tumbes,
periodo 2000–2026*



(*) Hasta la SE 04/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Hasta la SE 04-2026 se ha reportado 01 caso de ofidismo procedente del distrito de San Juan de la Virgen. En el año 2025 se confirmaron 16 casos de ofidismo de los cuales el 50,00% proceden del distrito de Matapalo, seguidos de los distritos de Zarumilla (18,75%), San Jacinto (12,50%), Aguas Verdes (12,50%) y Tumbes (6,25%) (Tabla 17).

En el 2024 se confirmaron 08 casos de ofidismo procedente de Punta Sal-Cancas, Quebrada Seca y nuevo progreso- Matapalo y Aguas Verdes (Gráfico 23).

LOXOCELISMO


Tabla 18. Casos de loxocelismo según distrito,
Región Tumbes, 2024-2026* (SE01-04)

Distrito	2024	2025	2026
Papayal	1	-	-
Tumbes	1	-	-
Matapalo	-	1	-
Zarumilla	-	2	-
Total	2	3	-

(*) Hasta la SE 04/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Gráfico 24. Comportamiento de loxocelismo, Región Tumbes,
periodo 2006–2026*



(*) Hasta la SE 04/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Hasta la SE 04-2026 no se reportan casos. En el año 2025 se confirmaron 03 casos de loxocelismo procedentes de los distritos de Zarumilla y Matapalo (Tabla 18).

El comportamiento de los casos de loxocelismo desde el año 2016 han ido disminuyendo, es así que en los últimos 10 años los casos oscilan entre 1 a 2 eventos por año. En el 2024 se confirmaron 02 casos de loxocelismo (Gráfico 24).

TUBERCULOSIS (TBC)

Hasta la SE 53-2025 se notificaron 199 casos de tuberculosis, de los cuales el 83,90% corresponden a casos nuevos y el 16,10% corresponden a casos anteriormente tratados, siendo el sexo masculino los más afectados con el 71,90% y las mujeres representan el 28,10% de los casos, según curso de vida los adultos son el grupo más afectado con el 52,30% de los casos, seguidos de los adultos mayores con el 22,60% y los jóvenes con el 20,10%; de los cuales el 87,40% se localizan a nivel pulmonar.

Además, el 13,60% (27 casos) presentan coinfección con diabetes mellitus y el 8,50% (17 casos) presentan coinfección con VIH-Positivos. También se ha reportado 01 gestante con tuberculosis, hasta la presente SE 53 se ha reportado 02 muertes asociadas a tuberculosis (Tabla 19).

Hasta la SE 52-2024 se notificaron 178 casos de tuberculosis en la Región de Tumbes (149 casos nuevos, 150 con localización pulmonar y 28 con localización extrapulmonar, 26 coinfección con diabetes mellitus y 16 coinfección con VIH-Positivos). Además, se reportan 06 muertes asociadas a tuberculosis, con una letalidad de 3,40%.

Tabla 19. Caracterización de los casos de
tuberculosis, Región Tumbes, 2024-2025*

Características		2024		2025*	
		Frecuencia	%	Frecuencia	%
Sexo	Masculino	118	66.3	143	71.9
	Femenino	60	33.7	56	28.1
Curso de vida	Niño (0-11)	2	1.1	2	1.0
	Adolescente (12-17)	7	3.9	8	4.0
	Joven (18-29)	39	21.9	40	20.1
	Adulto (30-59)	90	50.6	104	52.3
	Adulto Mayor (60+)	40	22.5	45	22.6
Localización	Extrapulmonar	28	15.7	25	12.6
	Pulmonar	150	84.3	174	87.4
Ingreso	Antes tratado	29	16.3	32	16.1
	Nuevo	149	83.7	167	83.9
Coinfección	VIH positivo	16	9.0	17	8.5
	Diabetes	26	14.6	27	13.6
Gestante	SI	0	0.0	1	0.5
Muerte	Asociada a TB	6	3.4	2	1.0
Total de casos		178	100	199	100

(*) Hasta la SE 53/2025

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA



Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) - Región Tumbes SE 04-2026

Tabla 20. Densidad de incidencia e incidencia acumulada de infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), según factor de riesgo y servicio hospitalario, Hospital Regional II-2 JAMO - Tumbes, 2025

Tipo de IAAS	Factor de riesgo	Servicio hospitalario	N° de IAAS mensual												N° de días de exposición y procedimientos acumulados	Total, IAAS	Tasa acumulada	Tasa referencial de EESS II-2	Tasa nacional II-2
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Neumonía	Ventilación mecánica	UCI Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	0	0,00	1,87	1,66
		UCI adulto	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	989	2	2.02	10,71	7,12
Infección del tracto urinario	Sonda Vesical	UCI adulto	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1373	3	2.18	2,04	1,98
		Medicina	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1358	1	0.74	1,48	1,93
		Cirugía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	0	0,00	0,39	0,79
Infección del torrente sanguíneo	Catéter Venoso Central	UCI Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	0	0,00	2,35	3,48
		UCI adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1344	0	0,00	1,59	1,18
	Nutrición Parenteral Total	UCI Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		UCI adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00
	Catéter Hemodiálisis	UCI adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0	0,00	0,00	0,00
	Catéter Venoso Periférico	UCI Neonatal	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	569	1	1.76	0,41	0,66
Infección de sitio quirúrgico	Colecistectomía	Cirugía	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	210	1	0.48	0,16	0,13
	Hernia Inguinal	Cirugía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0,00	0,31	0,62
	Prótesis de Cadera	Traumatología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00	0,00	1,03
	Parto cesáreo	Gineco-obstetricia	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0	0	1140	6	0.53	0,65	0,91
Endometritis	Parto Vaginal	Gineco-obstetricia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746	0	0,00	0,06	0,06
	Parto cesáreo	Gineco-obstetricia	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1140	2	0.18	0,13	0,10
Total			1	0	0	2	5	0	4	3	0	1	0	0		16			

(*) Hasta la SE 53/2025

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Hasta SE 53-2025 el Hospital Regional II-2 JAMO – Tumbes ha notificado 16 IAAS distribuida en el servicio de UCI adulto, neonatología, medicina y gineco-obstetricia.

La tasa acumulada de IAAS por neumonía asociado a ventilación mecánica en UCI adulto es de 2,02 casos por 1000 días de exposición, que es menor al valor nacional referencial.

La densidad de incidencia para infección del tracto urinario por sonda vesical en UCI adulto es de 2,18 casos por 1000 días de exposición que es mayor al valor nacional de referencia.

La densidad de incidencia para infección del tracto urinario por sonda vesical en medicina es de 0,74 casos por 1000 días de exposición que es menor al valor nacional de referencia.

La densidad de incidencia para infección del torrente sanguíneo por catéter venoso periférico en UCI neonatal es de 1,76 casos por 1000 días de exposición que triplica el valor nacional de referencia.

La tasa acumulada de IAAS por infección del sitio quirúrgico asociado a colecistectomía en cirugía es de 0,48 casos por 1000 días de exposición, que es mayor al valor nacional referencial.

La tasa acumulada de IAAS en ginecobstetricia por infección de sitio quirúrgico asociado a parto por cesárea es menor que el valor nacional referencial (0,53 vs 0,91).

La tasa acumulada de IAAS en ginecobstetricia por endometritis asociada a parto por cesárea es mayor que el valor nacional referencial (0,18 vs 0,10).

Es necesario implementar medidas urgentes que permitan reducir estas incidencias, así como investigar la ocurrencia de brotes, los agentes involucrados y los factores condicionantes.



Tabla 21. Densidad de incidencia e incidencia acumulada de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), según factor de riesgo y servicio hospitalario, Hospital Carlos Alberto Cortez Jiménez Essalud - Tumbes, 2025

Tipo de IAAS	Factor de riesgo	Servicio hospitalario	N° de IAAS mensual												N° de días de exposición y procedimientos acumulados	Total IAAS	Tasa acumulada	Tasa referencial de EESS II-1	Tasa nacional II-1
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Neumonía	Ventilación mecánica	UCI adulto	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	775	6	7.74	7,53	7,12
Infección del tracto urinario	Sonda Vesical	UCI adulto	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1005	2	1.99	2,46	1,98
		Medicina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	0	0,00	0,79	1,93
Infección del torrente sanguíneo	Catéter Venoso Central	UCI adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877	0	0,00	1,08	1,18
	Nutrición Parenteral Total	UCI adulto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Catéter Hemodiálisis	UCI adulto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0,00	0,00	0,00
Infección de sitio quirúrgico	Parto cesáreo	Gineco-obstetricia	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	323	6	1.86	0,68	0,91
Endometritis	Parto Vaginal	Gineco-obstetricia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0	0,00	0,05	0,06
	Parto cesáreo	Gineco-obstetricia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	0	0,00	0,10	0,10
Total			3	3	3	1	1	2	1	0	0	0	0	0		14			

(*) Hasta la SE 53/2025

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

El Hospital Carlos Alberto Cortez Jiménez Essalud - Tumbes, hasta la SE 53-2025, ha notificado 14 infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS) en el servicio de UCI adulto y ginecobstetricia.

La tasa acumulada de IAAS por neumonía asociado a ventilación mecánica en UCI adulto es de 7,74 casos por 1000 días de exposición, que es mayor al valor nacional referencial.

La densidad de incidencia para infección del tracto urinario por sonda vesical en UCI adulto es de 1,99 casos por 1000 días de exposición que es mayor al valor nacional de referencia.

La tasa acumulada de IAAS en ginecobstetricia por infección de sitio quirúrgico asociado a parto por cesárea supera el valor nacional referencial (1,86 vs 0,91).

Es necesario implementar medidas urgentes que permitan reducir estas incidencias, así como investigar la ocurrencia de brotes, los agentes involucrados y los factores condicionantes.



Te invitamos a revisar la Sala Semanal de
Situación de Salud Binacional (Tumbes- El Oro)

Link:

[https://binacional.shinyapps.io/binacional_peru
_ecuador/](https://binacional.shinyapps.io/binacional_peru_ecuador/)



Donde encontrarás información semanal
actualizada de la situación de salud de daños
priorizados del Cordón Fronterizo 01