



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección Regional
de Salud Tumbes



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO REGIONAL 2026



CONTENIDO

Dengue
Malaria
Zika
Chikungunya
Leptospirosis
EDAS
IRAS
Neumonías
Muerte Materna y Perinatal
Infecciones Intrahospitalarias
Otros daños sujetos a vigilancia
epidemiológica



Semana
Epidemiológica
N° 16



DIRECCION EJECUTIVA
EPIDEMIOLOGIA

(Del 19 al 25 de abril del 2026)

DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA

PRESENTACIÓN

La Dirección Ejecutiva de Epidemiología hace llegar el presente boletín correspondiente a la Semana Epidemiológica 16-2026.

La información del presente Boletín Epidemiológico procede de la notificación de 47 establecimientos de salud de la Red Regional de Epidemiología.

La Red Regional está conformada por establecimientos de la Dirección Regional de Salud Tumbes, EsSalud y otros del sector salud de la región Tumbes.

La información es actualizada cada semana o mes. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación.

Esta información es suministrada semanalmente por la Red Regional de Epidemiología de Tumbes, cuya fuente es el registro semanal de enfermedades y eventos sujetos a notificación inmediata o semanal. La Semana Epidemiológica inicia el domingo de cada semana y concluye el día sábado siguiente.

VERSIÓN ELECTRÓNICA

El boletín es un producto de la Dirección Ejecutiva de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud Tumbes. Se autoriza el uso total o parcial siempre y cuando se expresen las fuentes de información de este producto.



www.epi.diresatumbes.gob.pe



epitumbes@dge.gob.pe

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE SALUD TUMBES

Mg. Lisseth Roxana Chacaltana Crisanto

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

- ❖ Mg. Percy Mc Quen Vilchez Barreto
Director Ejecutivo
- ❖ Dr. Wilmer Jhon Davis Carrillo
Director de Inteligencia Sanitaria en Salud Pública
- ❖ Mg. Rommell Veintimilla Gonzalez Seminario
Director de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública
- ❖ Dra. María Edith Solis Castro
Director de Brotes y EVISAP
- ❖ Mg. Luis Constantino Arévalo Guerrero
Equipo Técnico
- ❖ Md. Christian Marzzio González Chicoma
Equipo Técnico
- ❖ Bach. Ronald Edward Hernández Vargas
Equipo Técnico
- ❖ Lic. Estefani Yudith Espinoza Risco
Equipo Técnico
- ❖ Lic. Judith Sofia Zarate Mogollon
Equipo Técnico
- ❖ Obst. Vicente Andres Cordova Zarate
Equipo Técnico
- ❖ Lic. Esmeralda Berline Herrera Silva
Equipo Técnico
- ❖ Lic. Carlos Jonathan Palacios Olaya
Equipo Técnico
- ❖ Ing. Jhon Cristhian Carbajal Crisanto
Equipo Técnico
- ❖ Téc. Contab. César Augusto Palacios Chalen
Digitador
- ❖ Lic. Adm. Tatiana Lisseth Vasquez Jimenez
Asistente Administrativo

REDACCION Y EDICIÓN

- ❖ Obst. Vicente Andres Córdova Zarate
- ❖ Bach. Ronald Edward Hernández Vargas

PROCESO DE INFORMACIÓN

- ❖ Bach. Ronald Edward Hernández Vargas

DISEÑO

- ❖ Bach. Ronald Edward Hernández Vargas
- ❖ Ing. Jhon Cristhian Carbajal Crisanto

Alerta Epidemiológica por Leptospirosis


La Dirección Regional de Salud de Tumbes, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Epidemiología ha emitido la Alerta Epidemiológica Regional N° 002-2026, por el **“ALTO RIESGO DE INCREMENTO DE CASOS DE LEPTOSPIROSIS POST-LLUVIAS E INUNDACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES”**; con el objetivo de alertar a los establecimientos de salud públicos y privados en el ámbito regional, ante el alto riesgo de incremento de casos de leptospirosis post-lluvias e inundaciones, con la finalidad de fortalecer la identificación temprana, notificación e investigación epidemiológica, diagnóstico y tratamiento oportuno de los casos, reforzar el seguimiento de casos de leptospirosis, priorizar las actividades de prevención y control en comunidad, fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica e investigación así como las acciones prevención, diagnóstico, tratamiento y control en las IPRESS. <https://www.diresatumbes.gob.pe/index.php/direcciones/epidemiologia/alertas-epidemiologicas>

¿Qué es la Leptospirosis?

Es una enfermedad que se transmite por contacto con orina de animales infectados con la bacteria leptospira, presentes en aguas estancadas post-lluvias o por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria.



Síntomas



¿Qué vigilar para reportar?



¿Qué hago para no enfermarme?





Dengue - Región Tumbes SE 16-2026

En lo que va del año 2026 la región de Tumbes ha notificado 624 casos de dengue, de los cuales el 38,46% son confirmados y el 61,54% se encuentran en calidad de probables; según cuadro clínico el 92,15% corresponde a dengue sin signos de alarma, el 7,53% corresponden a casos de dengue con signos de alarma y el 0,32% son dengue grave (Tabla1).

Tabla 1. Distribución según forma clínica y SE de inicio de enfermedad reportados hasta SE16-2026

Dengue	Confirmado	Probable	casos
Sin signos de alarma	218	357	575
Con signos de alarma	20	27	47
Grave	2	0	2
Defunción	0	0	0
Departamento de Tumbes	240	384	624

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Tabla 2. Número de casos, incidencia y defunciones de dengue, Región Tumbes, periodo 2022*-2026*

	2022*	2023*	Años 2024*	2025*	2026*
N.º de casos*	458	729	3425	547	624
Diferencia respecto al año anterior (%)	0	59,2	369,8	-84	14,1
Incidencia por 100mil hab.	176,46	277,06	1288,4	203,32	186,1
Defunciones	0	9	1	1	0

(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

En comparación a lo reportado en la misma SE 16 del año 2025 con 547 casos, se evidencia en el presente 2026 un aumento del 14,10% respecto al año anterior. La TIA en el 2025 a la SE 16 se encontraba en 203,32 casos por 100 mil habitantes. En el presente año no se han notificado defunciones por dengue (Tabla 2).

Tabla 3. Tasa de incidencia acumulada distrital de dengue a la SE 16, Región Tumbes, periodo 2025-2026*


Distritos	2025			2026		
	casos	%	TIA 100 mil Hab.	casos	%	TIA 100 mil Hab.
Pampas de Hospital	52	9,51	599,22	51	8,17	543,88
Corrales	56	10,24	233,19	133	21,31	414,74
Tumbes	316	57,77	346,90	332	53,21	268,96
San Juan de la Virgen	64	11,70	1000,78	16	2,56	232,09
Zorritos	19	3,47	95,21	35	5,61	161,08
San Jacinto	9	1,65	89,49	17	2,72	156,05
Papayal	11	2,01	93,97	8	1,28	62,95
La Cruz	6	1,10	48,20	6	0,96	44,46
Zarumilla	6	1,10	17,74	16	2,56	36,62
Matapalo	2	0,37	26,76	2	0,32	24,69
Casitas	0	0,00	0,00	1	0,16	14,30
Canoas de Punta Sal	3	0,55	29,66	5	0,80	15,59
Aguas Verdes	3	0,55	11,16	2	0,32	5,71
Departamento Tumbes	547	100,00	203,32	624	100,00	186,07

(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Hasta la SE 16 del año 2026 se registran 624 casos de dengue, que corresponde a una tasa de incidencia acumulada (TIA) de 186,07 x 100 mil hab. (Tabla 3). El 100,00% (13/13) de los distritos reportan casos de dengue, siendo los distritos de Tumbes (53,71%), Corrales (21,31%) y Pampas de Hospital (8,17%) los que presentan el mayor número de casos (Tabla 3).

Gráfico 1. Comportamiento de dengue, Región Tumbes, 2026 (SE 01-16)
canal endémico



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

En la presente SE del 2026 la Región Tumbes se encuentra en zona de **EPIDEMIA** para dengue, lo que indica una alta transmisión de la enfermedad, en las últimas semanas del presente año muestra un aumento de casos (Gráfico 1).




Tabla 4. Tasa de incidencia acumulada
según Curso de Vida, Tumbes 2026 (SE 01-16)

Curso de vida	Casos	%	T.I.Ax100 mil hab.
Niño [0-11]	196	31,41%	330,38
Adolescente [12-17]	95	15,22%	280,28
Joven [18-29]	115	18,43%	184,33
Adulto [30-59]	162	25,96%	119,84
Adulto mayor [60+]	56	8,97%	125,62
Total	624	100,00%	186,07

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB)
– CDC/MINSA

Con relación al sexo las mujeres resultan ser más afectadas (54,01%) (Gráfico 2).


Gráfico 3. Mapa de Riesgo de la 10-15/2026
(Seis últimas semanas)



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB)
– CDC/MINSA

Según curso de vida los casos se distribuyen en todas las edades, con mayor frecuencia en adultos y niños. Las TIA más altas corresponden a los niños y adolescente (330,38 x 100 mil hab. y 280,28 x 100 mil hab. respectivamente) (Tabla 4).


Gráfico 2. Distribución de casos según Sexo, Tumbes 2026 (SE01-16)



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/ MINSA

En las últimas seis semanas los distritos de Corrales y Pampas de Hospital muestran alto riesgo de transmisión, seguidos de los distritos de Zorritos, San Jacinto y Tumbes con mediano riesgo de transmisión de dengue (Gráfico 3).

Gráfico 4. Comportamiento de dengue y casos de febriles por semanas epidemiológicas, Tumbes, 2021-2026*




(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

El gráfico 4, muestra la evolución temporal de los casos febriles (línea) y casos confirmados de dengue (barras) por semanas epidemiológicas en la región Tumbes, durante el período 2021–2026 (hasta la SE 16/2026). Se observa un patrón endemo-epidémico claramente estacional, con incrementos recurrentes de cuadros febriles que preceden o acompañan los picos de dengue. Al inicio de 2026, ambas series muestran una tendencia ascendente.

Dengue vs variables climáticas SE 01-16/2026**Gráfico 5. Temperatura media y Casos de Dengue (2025-2026*)**

TUMBES -
Temperatura media
Dengue 2025-2026



(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Tmedia (clima): Media histórica (2001-2020) de la temperatura media semanal


Tmedia actual: Temperatura media semanal

Se observa que la temperatura y la lluvia presenta una relación directa con los casos de dengue para la Región Tumbes. Desde la SE 16-2025 la temperatura media ambiental ha disminuido trayendo consigo una disminución de los casos de dengue.

Según proyección de la temperatura media para lo que queda del 2025 e inicio del 2026 se espera un incremento de está proyectándose también probablemente un mayor número de casos de dengue (Grafico 5).

Gráfico 6. Precipitación y Casos de Dengue (2025-2026*)

TUMBES -
Precipitación
Dengue 2025-2026



(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Tmedia (clima): Media histórica (2001-2020) de la temperatura media semanal


Tmedia actual: Temperatura media semanal

Situación similar se observa con las precipitaciones pluviales y su relación con los casos de dengue. Al inicio de año ante el incremento de lluvias doce semanas después los casos ascendieron (Grafico 6).

Dengue vs variables climáticas SE 01-16/2026**Abril 2026 - Junio 2026**

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, pone a disposición el pronóstico trimestral de lluvias y temperaturas extremas para los tomadores de decisiones de los sectores sensibles al clima como la agricultura, la salud, los recursos hídricos y la gestión de riesgos de desastres. Los pronósticos trimestrales están enmarcados en la escala estacional y obedecen a las condiciones esperadas de la temperatura superficial del mar, así como los factores atmosféricos asociados a la variabilidad del clima que posteriormente son analizados bajo un enfoque de Consenso.

Gráfico 7. Pronóstico climático de precipitaciones y casos de dengue, Región de Tumbes, SE 01-16/2026




Fuente: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-climatico>

SUPERIOR

Cuando las probabilidades de ocurrencia de temperaturas máximas son superiores a lo esperado.

Gráfico 9. Pronóstico climático de temperatura mínima y casos de dengue, Región de Tumbes, SE 01-16/2026




Fuente: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-climatico>

NORMAL-SUPERIOR

Cuando las probabilidades de ocurrencia de precipitaciones son superiores a lo esperado.

Gráfico 8. Pronóstico climático de temperatura máxima y casos de dengue, Región de Tumbes, SE 01-16/2026



Fuente: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-climatico>

SUPERIOR

Escenario más probable de temperatura mínima es superior a las condiciones normales.



Chikungunya - Región Tumbes SE 16/2026

Tabla 5. Casos de Fiebre por virus Chikungunya por procedencia, Región Tumbes (SE 01–53/2025)

Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIAx100mil hab.
	N.º	TIAx100mil hab.	N.º	TIAx100mil hab.		
TUMBES	0	0,00	16	17,56	16	17,56
LA CRUZ	0	0,00	1	8,03	1	8,03
ZORRITOS	0	0,00	1	5,01	1	5,01
Total	0	0,00	18	6,69	18	6,69

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Tabla 6. Casos de fiebre por virus Chikungunya por procedencia, Región Tumbes, 2024*–2025*

Distritos	2024*		2025*		Casos en la SE 46 2025
	casos	%	casos	%	
TUMBES	15	46.88	16	88.89	0
ZORRITOS	0	0.00	1	5.56	0
LA CRUZ	1	3.13	1	5.56	0
AGUAS VERDES	2	6.25	0	0.00	0
ZARUMILLA	9	28.13	0	0.00	0
CORRALES	1	3.13	0	0.00	0
PAPAYAL	4	12.50	0	0.00	0
Dpto Tumbes	32	100.00	18	100.00	0

(*) Hasta la SE 53/2025

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Según curso de vida los casos notificados hasta la SE 53-2025 corresponden según frecuencia a niños (72,22%) (Tabla 7).

A la SE 16-2026 no se han registrado casos de Chikungunya.

En el 2025 a la SE 53 se reportaron 18 casos probables; distribuidos en los distritos de Tumbes (88,90%), La Cruz (5,55%) y Zorritos (5,55%) (Tabla 5).

En el 2024 se reportaron 32 casos de Chikungunya, de los cuales 05 casos son confirmados (15,63%) y 27 casos están como probables (84,37%) (Tabla 6).

Tabla 7. Casos de fiebre por virus Chikungunya por curso de vida, Región Tumbes, 2025 (SE 01–53)

curso de vida	Frecuencia	%
Niño [0-11]	13	72,22%
Adolescente [12-17]	1	5,56%
Joven [18-29]	2	11,11%
Adulto [30-59]	1	5,56%
Adulto Mayor [60+]	1	5,56%
Total	18	100,00%

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Tabla 8. Casos y tasas de incidencia acumulada de fiebre por virus Chikungunya, Perú, 2023-2025*

Departamentos	2023			2024			2025*			Casos en la SE 52 2025
	casos	%	TIA 100 000 Hab.	casos	%	TIA 100 000 Hab.	casos	%	TIA 100 000 Hab.	
TUMBES	18	22,78	6,84	32	84,21	12,04	18	75,00	6,69	0
LORETO	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2	8,33	0,19	0
LIMA	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	4,17	0,01	0
PIURA	47	59,49	2,21	6	15,79	0,28	1	4,17	0,05	0
LAMBAYEQUE	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	4,17	0,07	0
AYACUCHO	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	4,17	0,15	0
PASCO	1	1,27	0,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
SAN MARTIN	13	16,46	1,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Perú	79	100,00	0,23	38	100,00	0,11	24	100,00	0,07	0

(*) Hasta la SE 53/2025

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

A nivel nacional, hasta la SE 53 del 2025 se han notificado 24 casos de Chikungunya. En el 2024 desde la SE 01 hasta la SE 52, se notificaron 38 casos de Chikungunya en el país, Tumbes aporta con el 84,21% de los casos de todo el país (Tabla 8).



Leptospirosis - Región Tumbes SE 16-2026

A la SE 16-2026 se han registrado 342 casos de leptospirosis, de las cuales se han confirmado 134 casos (39,18%) y 208 casos (60,82%) se encuentra en calidad de probable. La TIA regional en el 2026 se encuentra en 101,98 casos x 100 mil hab. 04 distritos presentan una TIA por encima del valor regional: Pampas de Hospital (181,29), Tumbes (163,64%), San Jacinto (165,23%) y Corrales (102,91%) (Tabla 9). En el presente año se han notificado 02 defunciones por leptospirosis las que corresponden a una menor de 11 años y un varón de 36 años ambos procedentes del distrito de Tumbes.

En el 2025 a la SE 53 se reportaron casos 322 casos de Leptospirosis, de los cuales 282 casos (87,58%) son probables y 40 casos (12,42%) son confirmados.

La TIA regional en el 2025 es de 121,12 casos x 100 mil hab. 04 distritos presentan una TIA por encima del valor regional: San Juan de la Virgen, Corrales, Tumbes y San Jacinto.


Tabla 9. Tasa de incidencia y casos de Leptospirosis según distrito de infección, Región Tumbes, 2026

Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIAx100mil hab.
	N.º	TIAx100mil hab.	N.º	TIAx100mil hab.		
Tumbes	77	62,38	125	101,26	202	163,64
Pampas de Hospital	5	53,32	12	127,97	17	181,29
San Jacinto	7	64,26	11	100,97	18	165,23
Corrales	16	49,89	17	53,01	33	102,91
La Cruz	5	37,05	6	44,46	11	81,51
Zarumilla	13	29,76	16	36,62	29	66,38
San Juan de la Virgen	3	43,52	4	58,02	7	101,54
Casitas	0	0,00	3	42,91	3	42,91
Zorritos	1	4,60	6	27,61	7	32,22
Canoas de Punta Sal	1	9,10	1	9,10	2	18,21
Papayal	2	15,74	2	15,74	4	31,48
Matapalo	1	12,34	0	0,00	1	12,34
Aguas Verdes	3	8,57	5	14,29	8	22,86
Departamento de Tumbes	134	39,96	208	62,02	342	101,98

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Gráfico 10. Mapa de Riesgo según 06 últimas semanas epidemiológicas, Región Tumbes, (10-15/2026)

El comportamiento de la notificación de casos de leptospirosis en las últimas 6 semanas del 2026 ubicó a los distritos de San Jacinto, Tumbes y Pampas de Hospital con alto riesgo de transmisión (Gráfico 10).



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Tabla 10. Casos acumulados de leptospirosis por grupos de curso de vida, Región Tumbes, 2026

Curso de vida	casos	%	T.I.Ax100mil hab.
Niño [0-11]	97	28,36%	163,51
Adolescente [12-17]	53	15,50%	156,37
Joven [18-29]	58	16,96%	92,97
Adulto [30-59]	91	26,61%	67,32
Adulto mayor [60+]	43	12,57%	96,46
Total	342	100,00%	101,98

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

En el 2026, según curso de vida, los grupos más afectados son los niños y adolescente (TIA: 163,51 x 100 mil hab. y 156,37 x 100 mil hab. respectivamente) (Tabla 10).

**Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), Neumonías y SOB
- Región Tumbes SE 16-2026**


Hasta la SE 16 del presente año se han notificado a nivel regional 3580 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en menores de 5 años; además se han notificado 50 casos de neumonías, de las cuales 06 por neumonía grave y 243 casos de SOB (Tabla 11).

Tabla 11. Casos de IRAs en < 05 años según tipo de diagnóstico,
Región Tumbes (SE 01-16/2026)

Diagnóstico	N.º casos/semana																Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
IRA	192	153	156	164	157	143	146	172	244	262	314	323	289	293	273	299	3580
Neumonía	4	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	5	4	0	6	10	44
Neumonía grave	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	6
SOB	17	16	15	10	14	3	8	6	9	17	20	16	23	22	30	17	243
Total	213	171	172	175	173	147	155	179	256	282	337	344	317	315	310	327	3873

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Gráfico 11. Incidencia acumulada distrital de IRAs en < de 5 años,
Región Tumbes, 2026 (SE01-16)



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB)
– CDC/MINSA

Gráfico 12. Mapa de riesgo de IRAs en < de 5 años según
03 últimas semanas epidemiológicas 14-16/2026




Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

La tasa de incidencia acumulada regional de IRAs en <05 años es de 1863,37 x 10 mil hab., 10 distritos presentan las incidencias por encima del valor regional: Casitas, Zorritos, Papayal, Pampas de Hospital, San Juan de la Virgen, La Cruz, Agua Verde, San Jacinto, Canoas de Punta Sal y Corrales.

Según priorización de riesgo los distritos de San Jacinto, San Juan de la Virgen, Casitas y Papayal presentan alto riesgo (Gráfico 11). En relación a las últimas 03 semanas los distritos de Zorritos, Casitas, San Jacinto y Papayal presentan alto riesgo de transmisión de IRAs (Gráfico 12).

Gráfico 13. Comportamiento de IRAs, Región Tumbes, 2026 (SE 01-16)
canal endémico




Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

El canal endémico de IRAs muestra que hasta la SE 16-2026 se encuentran en zona de **SEGURIDAD** (Gráfico 13).




COVID-19

Gráfico 14. Comportamiento de COVID-19, Región Tumbes, 2020 -2026* (a SE 16)

(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Desde el año 2023 los casos de COVID-19 se han reducido notablemente, reduciéndose a un promedio de dos casos por semana. A lo largo de todo el período de la pandemia se observa similar comportamiento de la frecuencia de casos con el número de hospitalizaciones. En las primeras 03 semanas del 2025 se observa un incremento de casos que superan el promedio semanal (Gráfico 14).

Gráfico 15. Comportamiento de los linajes de las Variantes de COVID-19, Región Tumbes, 2026 (a SE 16)

Si bien ha existido un predominio del linaje XBB 1.5 hasta el tercer trimestre del año 2023, se observa que el linaje JN.1 desde el último trimestre y hasta la fecha predomina, llegando incluso a ser el único linaje detectado.

Esta situación amerita mantener la vigilancia laboratorial a fin de establecer la aparición o el predominio de nuevos linajes resistentes o no afectados por la vacuna (Gráfico 15).


Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Tabla 12. TIA de casos confirmados de COVID-19 por distritos, Región Tumbes, 2020-2026* (a SE 16)

Distrito de Residencia	Casos confirmados							Nuevos Uti. S.E	%	Población 2026	TIA* 2026
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
TUMBES	14,377	9,391	8,173	451	57	92	10	0	0.07%	123,440	8.1
ZARUMILLA	1,845	1,364	861	29	22	18	2	1	0.01%	43,687	4.6
CORRALES	1,765	1,796	1,520	29	1	4	1	0	0.01%	32,068	3.1
PAMPAS DE HOSPITAL	295	507	424	11	1	2	0	0	0.00%	9,377	0.0
ZORRITOS	725	671	742	36	7	6	0	0	0.00%	21,729	0.0
SAN JACINTO	317	316	344	8	0	1	0	0	0.00%	10,894	0.0
PAPAYAL	541	190	210	23	0	1	0	0	0.00%	12,708	0.0
LA CRUZ	732	524	605	12	1	0	0	0	0.00%	13,495	0.0
AGUAS VERDES	1,040	513	275	6	3	2	0	0	0.00%	34,996	0.0
MATAPALO	99	85	114	12	2	0	0	0	0.00%	8,101	0.0
SAN JUAN DE LA VIRGEN	173	328	421	7	1	1	0	0	0.00%	6,894	0.0
CASITAS	22	37	99	2	0	0	0	0	0.00%	6,991	0.0
CANALES DE PUNTA SAL	153	167	210	5	1	0	0	0	0.00%	10,984	0.0
OTRAS REGIONES DE PERÚ	237	232	30	4	2	0	0	0	0.00%		
ECUADOR	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
Total	22,329	16,121	14,028	635	98	127	13	1	0.09%	335,364	3.9

(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Gráfico 16. Casos de COVID-19 según sexo, Región Tumbes, 2026 (a SE 16)

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Hasta la presente semana 16-2026 se han reportado 13 casos de COVID-19. La TIA regional del 2026 se encuentra en 3,90 x 10 mil hab. (Tabla 12). El distrito de Tumbes presenta alto riesgo de transmisión.

La población y las autoridades deben mantenerse vigilantes ante brotes o conglomerados de casos y mantener las medias de autocuidado de la salud. El sexo femenino se encuentra más afectado (50,00%) (Gráfico 16). No se reportan defunciones.



Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) - Región Tumbes SE 16 - 2026

Tabla 13. Comportamiento de EDAs según semanas epidemiológicas, Región Tumbes, (SE 01-16/2026)

EDAs por curso de vida	N.º casos/semana																Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Menor de 1 año	2	12	11	9	19	20	24	21	25	23	22	17	13	16	12	11	257
De 1 a 4 años	30	51	45	45	50	80	73	58	81	84	89	75	60	49	26	33	929
Mayores de 5 años	94	91	110	117	129	166	149	170	208	233	191	246	140	224	153	102	2523
Total	126	154	166	171	198	266	246	249	314	340	302	338	213	289	191	146	3709

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA


Hasta la SE 16-2026 se han notificado 1186 casos de EDAs en menores de 05 años y 2523 casos en mayores de 05 años, los que sumados hacen un total de 3709 casos de EDAs en población general en la región Tumbes (Tabla 13).

Tabla 14. Tasa de incidencia x 10 mil hab. de las EDAs en < de 05 años, Región Tumbes, 2026 (SE01-16)

Distritos	Casos	Población	T.I x 10mil hab.
Casitas	20	129	1550,39
San Jacinto	80	612	1307,19
Canoas de Punta Sal	71	654	1085,63
Papayal	59	621	950,08
Pampas de Hospital	52	580	896,55
Aguas Verdes	134	1707	785,00
Zorritos	76	1023	742,91
La Cruz	42	704	596,59
Zarumilla	116	1958	592,44
Corrales	103	1907	540,12
Matapalo	22	447	492,17
San Juan de la Virgen	16	341	469,21
Tumbes	395	8530	463,07
Departamento Tumbes	1186	19213	617,29

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Gráfico 17. Mapa de riesgo de EDAs en < de 05 años, según 03 últimas semanas epidemiológicas, Región Tumbes, (14-16/2026)



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

La tasa de incidencia regional en < de 05 años es de 617,29 casos x 10 mil < de 05 años (Tabla 14); mientras que en las últimas 3 semanas epidemiológicas los distritos de Casitas y San Jacinto presentan alto riesgo de transmisión de EDAs (Gráfico 17).

Tabla 15. Tasa de incidencia x 10 mil hab. de las EDAs en población general, Región Tumbes, 2026 (SE01-16)

Distritos	Casos	Población	T.I x 10mil hab.
San Jacinto	281	10.894	257,94
Pampas de Hospital	210	9.377	223,95
Zorritos	353	21.729	162,46
Canoas Punta Sal	159	10.984	144,76
Casitas	95	6.991	135,89
Papayal	168	12.708	132,20
Corrales	376	32.068	117,25
La Cruz	140	13.495	103,74
Aguas Verdes	326	34.996	93,15
Matapalo	75	8.101	92,58
Tumbes	1.125	123.440	91,14
Zarumilla	360	43.687	82,40
San Juan de la Virgen	41	6.894	59,47
Departamento Tumbes	3709	335364	110,60

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Gráfico 18. Mapa de riesgo de EDAs en población general según 03 últimas semanas epidemiológicas, Región Tumbes, (14-16/2026)




Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

La tasa de incidencia regional en población general es de 110,60 casos x 10 mil hab. (Tabla 15); mientras que en las últimas 3 semanas epidemiológicas el distrito de San Jacinto presenta alto riesgo de transmisión de EDAs (Gráfico 18).

Según el canal endémico de EDAs en la presente semana nos encontramos en zona de **EPIDEMIA** (Gráfico 19).

Gráfico 19. Comportamiento de las EDAs en población general, Región Tumbes, 2026 (SE01-16) Canal Endémico



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA



Otros Daños de Notificación - Región Tumbes SE 16-2026


Hasta la SE 16-2026 se ha registrado 01 muerte materna directa de 38 años procedente del distrito de Tumbes.

En el año 2025 se reportó 01 muerte materna directa, precedente del distrito de Corrales.

En los últimos 10 años la razón de muerte materna (RMM) ha oscilado entre 22,4 x 100 mil nv a 137,6 x 100 mil nv (Gráfico 20).

MORTALIDAD FETAL Y NEONATAL

Gráfico 21. Comportamiento de las Muertes fetales y neonatales años 2010–2026*



(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Hasta la presente SE 16-2026 se han notificado 13 muertes fetales y neonatales, de las cuales de las cuales 07 corresponde a muertes fetales y 06 muertes neonatales. En el 2025 se notificaron 34 casos de muertes fetales y neonatales, de las cuales 19 corresponde a muertes fetales y 15 muerte neonatal. En el 2024 se notificaron 38 muertes perinatales, de las que 20 corresponden a muertes fetales y 18 a muertes neonatales (Gráfico 21).


En relación a las muertes neonatales el 83,33% se dieron en el tercer trimestre de la gestación (05 casos), con pesos que oscilaban desde los 1000-1499gr. (bajo peso al nacer) a 2500-3999gr. (peso adecuado) (Tabla 16).

VIRUELA DEL MONO (VIRUELA SÍMICA)

A la SE 16/2026 No se han reportado casos.

En el año 2024 se notificaron 6 casos sospechosos de Viruela del Mono en Tumbes, los cuales fueron descartados mediante PCR. En el año 2022 se confirmó 01 caso (varón de 29 años de edad).

Gráfico 21. Comportamiento de la Viruela del Mono, Región Tumbes, periodo 2020–2026*




(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

MORTALIDAD MATERNA

Gráfico 20. Comportamiento de las muertes maternas y razón de mortalidad materna, Región Tumbes, 2013-2023



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Tabla 16. muertes neonatales, según edad gestacional y peso al nacimiento, Región Tumbes, 2026 (SE01-16)


Edad Gestacional (Semanas)	Peso al nacimiento (gr)					Total
	Extremadamente bajo de peso al nacer (500-900gr)	Muy bajo peso al nacer (1000-1499 gr)	Bajo peso al nacer (1500-2499 gr)	Peso adecuado (2500 - 3999 gr)	Macrosómico o (4000 gr. a más)	
27		1				1
31		1				1
34				2		2
37			1			1
39				1		1
Total		2	1	3		6

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

MALARIA

Hasta la SE 16-2026 no se reportan casos. En el 2025 se notificaron 04 casos de malaria vivax de las cuales 02 corresponden a casos importados y 02 caso autóctonos.

Gráfico 22. Comportamiento de la Malaria, Región Tumbes, periodo 2000–2026*



(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA



Accidentes por Animales Ponzosñosos - Región Tumbes SE 16-2026

OFIDISMO


Tabla 17. Casos de ofidismo según distrito,
Región Tumbes, 2024-2026* (SE01-16)

Distrito	2024	2025	2026*
Matapalo	5	8	0
Zarumilla	0	3	2
Aguas Verdes	2	2	0
San Jacinto	0	2	0
Canoas De Punta Sal	1	0	0
Tumbes	0	1	0
San Juan De La Virgen	0	0	1
Papayal			1
Total	8	16	4

(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Gráfico 23. Comportamiento de ofidismo, Región Tumbes,
periodo 2000–2026*



(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Hasta la SE 16-2026 se ha reportado 04 casos de ofidismo procedentes de los distritos de San Juan de la Virgen, Zarumilla y Papayal. En el año 2025 se confirmaron 16 casos de ofidismo de los cuales el 50,00% proceden del distrito de Matapalo, seguidos de los distritos de Zarumilla (18,75%), San Jacinto (12,50%), Aguas Verdes (12,50%) y Tumbes (6,25%) (Tabla 17).

En el 2024 se confirmaron 08 casos de ofidismo procedente de Punta Sal-Cancas, Quebrada Seca y nuevo progreso- Matapalo y Aguas Verdes (Gráfico 23).

LOXOCELISMO


Tabla 18. Casos de loxoscelismo según distrito,
Región Tumbes, 2024-2026* (SE01-16)

Distrito	2024	2025	2026
Papayal	1	-	-
Tumbes	1	-	-
Matapalo	-	1	1
Zarumilla	-	2	2
Total	2	3	3

(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Gráfico 24. Comportamiento de loxoscelismo, Región
Tumbes, periodo 2006–2026*



(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Hasta la SE 16-2026 se ha reportado 03 casos de loxoscelismo procedentes de los distritos de Zarumilla y Matapalo. En el año 2025 se confirmaron 03 casos de loxoscelismo procedentes de los distritos de Zarumilla y Matapalo (Tabla 18).

El comportamiento de los casos de loxoscelismo desde el año 2016 han ido disminuyendo, es así que en los últimos 10 años los casos oscilan entre 1 a 2 eventos por año. En el 2024 se confirmaron 02 casos de loxoscelismo (Gráfico 24).

TUBERCULOSIS (TBC)

En la presente semana 16-2026 se han notificado 42 casos de tuberculosis, de los cuales el 95,20% corresponden a casos nuevos, siendo el sexo masculino los más afectados con el 61,90%, según curso de vida los adultos son el grupo más afectado con el 40,50% de los casos; de los cuales el 78,60% se localizan a nivel pulmonar.

Además, el 16,70% (07 casos) tienen la condición de diabetes y el 9,50% (04 casos) presentan coinfección con VIH-Positivos. Se reporta 01 gestante con tuberculosis, hasta la presente SE 15 no se reportan muertes asociadas a tuberculosis.

Hasta la SE 53-2025 se notificaron 206 casos de tuberculosis, de los cuales el 84,00% corresponden a casos nuevos, siendo el sexo masculino los más afectados con el 71,40%, según curso de vida los adultos son el grupo más afectado con el 51,50% de los casos; de los cuales el 87,90% se localizan a nivel pulmonar.

Además, se reportó 01 gestante con tuberculosis y 02 muertes asociadas a tuberculosis (Tabla 19).

Tabla 19. Caracterización de los casos de
tuberculosis, Región Tumbes, 2025-2026*

Características		2025		2026*	
		Frecuencia	%	Frecuencia	%
Sexo	Masculino	147	71.4	26	61.9
	Femenino	59	28.6	16	38.1
Curso de vida	Niño (0-11 años)	2	1.0	0	0.0
	Adolescente (12-17 años)	8	3.9	1	2.4
	Joven (18-29 años)	43	20.9	10	23.8
	Adulto (30-59 años)	106	51.5	17	40.5
	Adulto Mayor (60 años a mas)	47	22.8	14	33.3
Localización	Extrapulmonar	25	12.1	9	21.4
	Pulmonar	181	87.9	33	78.6
Ingreso	Antes tratado	33	16.0	2	4.8
	Nuevo	173	84.0	40	95.2
Coinfección	VIH positivo	17	8.3	4	9.5
	Diabetes	33	16.0	7	16.7
Gestante	SI	1	0.5	1	2.4
Muerte	Asociada a TB	4	1.9	0	0.0
Total de casos		206		42	

(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA



Enfermedades no Transmisibles - Región Tumbes SE 16-2026

DIABETES MELLITUS


Tabla 20. Casos notificados de diabetes según medida de frecuencia y tipo, Región Tumbes, 2020-2026*

Años	Incidentes			Prevalentes		Total
	Diabetes tipo I	Diabetes tipo II	Diabetes gestacional	Diabetes tipo I	Diabetes tipo II	
2020	0	11	0	0	36	47
2021	0	8	0	0	72	80
2022	1	245	2	3	386	637
2023	2	143	1	2	451	599
2024	0	37	1	0	302	340
2025	1	27	0	3	1252	1283
2026*	0	2	0	0	90	92
Total	4	473	4	8	2589	3078

(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Gráfico 25. Distribución de casos según Sexo, Tumbes 2026 (SE01-16)



Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/ MINSA

Hasta la presente SE 16-2026 se han notificado 92 casos de diabetes mellitus, de los cuales el 97,83% son casos prevalentes (antiguos) y el 2,17% corresponden a casos incidentes (nuevos); según tipo de diabetes el 100,00% de los casos son de tipo II (Tabla 20). En relación al sexo el 53,30% corresponden a mujeres (Gráfico 25).

En relación al año 2025 hasta la SE 53 se notificaron 1283 casos de diabetes mellitus, de los cuales el 97,82% fueron casos prevalentes (antiguos) y el 2,18% correspondieron a casos incidentes (nuevos); el 99,69% de los casos de diabetes son de tipo II (Tabla 20).

CANCER


Tabla 21. Casos notificados de cáncer según distrito (registro hospitalario), Región Tumbes, 2025-2026*

DISTRITO	2025	2026*
	CASOS	CASOS
Tumbes	75	9
Zarumilla	13	1
Corrales	11	1
Pampas de Hospital	10	0
Aguas Verdes	9	1
La Cruz	6	1
San Jacinto	5	0
Zorritos	5	0
Canoas Punta Sal	4	0
Papayal	2	0
San Juan de la Virgen	1	0
Casitas	0	0
Matapalo	0	0
Departamento Tumbes	141	13

(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Gráfico 26. Casos de cáncer por sexo según tipo de cáncer (registro hospitalario), Tumbes 2025-2026*



(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Al primer trimestre del 2026 el distrito de Tumbes concentra el 69,23% de los casos registrados de cáncer a nivel hospitalario (Tabla 21). En los últimos 2 años, el cáncer de cuello uterino es la neoplasia más importante que afecta a las mujeres con el 28,95%, seguido por el cáncer de mama con el 21,05% y en los varones la neoplasia más frecuente es el cáncer de estómago con el 18,96%, seguido del cáncer del sistema hematológico y linfático con el 13,79% y el cáncer de próstata con el 12,07% (Gráfico 26).

**Enfermedades inmunoprevenibles - Región Tumbes SE 16-2026****Tabla 22.** Casos confirmados de enfermedades inmunoprevenibles, Región Tumbes, 2021-2026*

Años	Tos ferina	Varicela		Parotiditis
		sin complicaciones	Complicaciones	
2021	1			
2022		2		
2023		22		3
2024		96		4
2025	10	31		
2026*	4	5		1
TOTAL	15	156	0	8

(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

TOS FERINA

Hasta la presente SE 16-2026 se han notificado 04 casos confirmados de Tos ferina en la región de Tumbes. En relación a los últimos 6 años, el 2025 ha sido el año con el mayor número de casos confirmados (66,66%), siendo los menores de un año el grupo más vulnerable y que corren un alto riesgo de padecer formas graves de la enfermedad e incluso la muerte (Tabla 22).

VARICELA

Hasta la presente SE 16-2026 se han notificado 05 casos confirmados de Varicela sin complicaciones en la región de Tumbes. En relación a los últimos 6 años, se han reportado un total de 156 casos de Varicela sin complicaciones, siendo el 2024 el año con el mayor número de casos confirmados (61,54%) (Tabla 22).

PAROTIDITIS

Hasta la presente SE 16-2026 se ha notificado 01 casos confirmados de Parotiditis en la región de Tumbes. En los últimos 6 años, se han reportado un total de 08 casos de Parotiditis, siendo el 2024 el año con el mayor número de casos confirmados (50,00%) (Tabla 22).

SARAMPIÓN

Hasta la presente SE 16-2026 no se han confirmado casos en la región de Tumbes.

DIFTERIA

Hasta la presente SE 16-2026 no se han confirmado casos en la región de Tumbes.

FIEBRE AMARILLA

Hasta la presente SE 16-2026 no se han confirmado casos en la región de Tumbes.

HEPATITIS B

Hasta la presente SE 16-2026 no se han confirmado casos en la región de Tumbes.

PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA

Hasta la presente SE 16-2026 no se han confirmado casos en la región de Tumbes.



Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) - Región Tumbes SE 16-2026

Tabla 23. Densidad de incidencia e incidencia acumulada de infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), según factor de riesgo y servicio hospitalario, Hospital Regional II-2 JAMO - Tumbes, 2026

Tipo de IAAS	Factor de riesgo	Servicio hospitalario	N° de IAAS mensual			N° de días de exposición y procedimientos acumulados	Total, IAAS	Tasa acumulada	Tasa referencial de EESS II-2	Tasa nacional II-2
			Enero	Febrero	Marzo					
Neumonía	Ventilación mecánica	UCI Neonatal	0	0	0	68	0	0,00	1,87	1,66
		UCI adulto	0	0	0	132	0	0,00	10,71	7,12
Infección del tracto urinario	Sonda Vesical	UCI adulto	0	0	0	208	0	0,00	2,04	1,98
		Medicina	0	0	0	452	0	0,00	1,48	1,93
		Cirugía	0	0	0	210	0	0,00	0,39	0,79
Infección del torrente sanguíneo	Catéter Venoso Central	UCI Neonatal	0	0	0	131	0	0,00	2,35	3,48
		UCI adulto	0	0	0	196	0	0,00	1,59	1,18
	Nutrición Parenteral Total	UCI Neonatal	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		UCI adulto	0	0	0	10	0	0,00	0,00	0,00
	Catéter Hemodiálisis	UCI adulto	0	0	0	26	0	0,00	0,00	0,00
	Catéter Venoso Periférico	UCI Neonatal	0	0	0	103	0	0,00	0,41	0,66
Infección de sitio quirúrgico	Colecistectomía	Cirugía	0	0	0	36	0	0,00	0,16	0,13
	Hernia Inguinal	Cirugía	0	0	0	16	0	0,00	0,31	0,62
	Prótesis de Cadera	Traumatología	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,03
	Parto cesáreo	Gineco-obstetricia	0	0	0	92	0	0,00	0,65	0,91
Endometritis	Parto Vaginal	Gineco-obstetricia	0	0	0	169	0	0,00	0,06	0,06
	Parto cesáreo	Gineco-obstetricia	0	1	0	311	1	0,32	0,13	0,10
Total			0	1	0		1			

(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

Hasta SE 16-2026 el Hospital Regional II-2 JAMO – Tumbes se ha notificado 01 caso de infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), distribuida en el servicio de gineco-obstetricia.

La tasa acumulada de IAAS en ginecobstetricia por endometritis asociada a parto por cesárea es mayor que el valor nacional referencial (0,49 vs 0,10).

Es necesario implementar medidas urgentes que permitan reducir estas incidencias, así como investigar la ocurrencia de brotes, los agentes involucrados y los factores condicionantes.



Tabla 24. Densidad de incidencia e incidencia acumulada de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), según factor de riesgo y servicio hospitalario, Hospital Carlos Alberto Cortez Jiménez Essalud - Tumbes, 2026

Tipo de IAAS	Factor de riesgo	Servicio hospitalario	N° de IAAS mensual			N° de días de exposición y procedimientos acumulados	Total IAAS	Tasa acumulada	Tasa referencial de EESS II-1	Tasa nacional II-1
			Enero	Febrero	Marzo					
Neumonía	Ventilación mecánica	UCI adulto	0	0	1	44	1	22.73	7,53	7,12
Infección del tracto urinario	Sonda Vesical	UCI adulto	0	0	0	182	0	0,00	2,46	1,98
		Medicina	0	0	0	90	0	0,00	0,79	1,93
Infección del torrente sanguíneo	Catéter Venoso Central	UCI adulto	0	0	0	70	0	0,00	1,08	1,18
	Nutrición Parenteral	UCI adulto	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Total	UCI adulto	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Catéter Hemodiálisis	UCI adulto	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Infección de sitio quirúrgico	Parto cesáreo	Gineco-obstetricia	0	0	0	94	0	0,00	0,68	0,91
	Parto Vaginal	Gineco-obstetricia	0	0	0	44	0	0,00	0,05	0,06
Endometritis	Parto cesáreo	Gineco-obstetricia	0	0	0	94	0	0,00	0,10	0,10
Total			0	0	1		1			

(*) Hasta la SE 16/2026

Fuente: Sistema de Notificación Epidemiológica online (NOTIWEB) – CDC/MINSA

El Hospital Carlos Alberto Cortez Jiménez Essalud - Tumbes, hasta la SE 16-2026, se ha notificado 01 caso de infección asociada a la atención de salud (IAAS) en el servicio de UCI adulto.

La tasa acumulada de IAAS por neumonía asociado a ventilación mecánica en UCI adulto es de 22,13 casos por 1000 días de exposición, que supera 3 veces al valor nacional referencial.



Te invitamos a revisar la Sala Semanal de
Situación de Salud Binacional (Tumbes- El Oro)

Link:

[https://binacional.shinyapps.io/binacional_peru
_ecuador/](https://binacional.shinyapps.io/binacional_peru_ecuador/)



Donde encontrarás información semanal
actualizada de la situación de salud de daños
priorizados del Cordón Fronterizo 01